

acca informa

Veda de la liebre en Álava

En el pasado Consejo Asesor de Caza se planteó por parte de ACCA la posibilidad de vedar la liebre en todo el Territorio Histórico de Álava durante la temporada 2007/2008. Esta propuesta vino motivada por el progresivo descenso que las liebres (europea e ibérica) están mostrando a lo largo y ancho de la geografía alavesa, descenso observado en los muestreos de campo realizados en marzo y agosto de cada año y ratificado posteriormente por las capturas obtenidas durante las temporadas de caza.

En el gráfico se reflejan los datos obtenidos por ACCA en los muestreos nocturnos con focos (IKA= nº de liebres vistas por kilómetro), así como las capturas anuales en Álava.

Existen numerosos estudios acerca de las oscilaciones interanuales que muestran las distintas especies de liebre (europea, ibérica, ártica, etc.). En algunos casos concluyen que la abun-

dancia anual de liebre está relacionada fundamentalmente con factores climatológicos (humedad, temperatura,...) durante la época de cría, con cambios en las siembras o incluso se habla, en otros casos, de ciclos naturales con máximos de abundancia que se repiten cada 9 ó 10 años.

En este sentido, la postura de ACCA en el Consejo de Caza fue clara: la regresión de la liebre en Álava no es consecuencia exclusivamente de la actividad cinegética, ya que existen zonas donde no se caza que están mostrando una tendencia similar. La veda no deja de ser una medida puntual por la escasez de ejemplares ante el inicio de la temporada, pero también se propuso desde ACCA que se lleven a cabo estudios para determinar cuáles son los actuales factores limitantes de las poblaciones de liebres en Álava y poder así definir las medidas correctoras oportunas que puedan llevar a su recuperación. ■

